


# Vorgehen bei positiver Allergieanamnese vor COVID-19-Impfung

## mRNA-Impfstoffe



\* Definition schwere allerg. Reaktion: < 1 h nach Agens systemischer Hautausschlag, verbunden mit mindestens einem weiteren Symptom: Luftnot und/oder Herz-Kreislauf-Reaktion  
 \*\* unter Berücksichtigung möglicher Kreuzreaktionen durch PEG (Polyethylenglycol, Macroglol)-haltige Verbindungen, wie z.B. Polysorbate

\*\*\* Allergologische Zentren in Deutschland, die im Hinblick auf diese Fragestellungen besonders vorbereitet sind:  
<https://dgaki.de/cac/> <https://aeda.de/covid-19-zentren>



### Allgemeine Hinweise

- Nach anderen Sofortreaktionen (z.B. vaso-vagale Reaktionen oder Panikattacken) kann unter erhöhter Notfallbereitschaft und einer Nachbeobachtung von 30 Minuten geimpft werden.
- Die Impfzentren bzw. mobilen Teams müssen mit einer Notfallausstattung zur Behandlung eventuell auftretender anaphylaktischer Reaktionen ausgestattet sein.

Dieses Flowchart wurde vom Paul-Ehrlich-Institut ([www.pei.de](http://www.pei.de)) und Robert Koch-Institut ([www.rki.de](http://www.rki.de)) in Abstimmung mit den Fachgesellschaften AEDA, DGAKI, NORA und DDG erstellt und ist urheberrechtlich geschützt. Es darf ausschließlich im Rahmen seiner Zwecke für eine nicht-kommerzielle Nutzung vervielfältigt und weitergegeben werden. Jegliche Bearbeitung oder Veränderung ist unzulässig.

Ausgabe 1 (Stand 25.03.2021)